

## কৃষক বাইজের জ্ঞাতার্থে

### বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ল'বলগীয়া কৃষি ব্যৱস্থা

ৰাজ্যখনত সৃষ্টি হোৱা সাম্প্ৰতিক বানপানীৰ ফলত অসমৰ কৃষকবাইজ বিভুৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। আহি থকা সময়চোৱাতো হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য বানপানী আৰু পানী শুকোৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৃষকবাইজে ল'বলগীয়া বিভিন্ন ব্যৱস্থাৱলীৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল

-

জুলাই মাহত হোৱা বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত :

- কঠীয়া নষ্ট হ'লে আৰু পুনৰ বানৰ আশংকা থাকিলে সমূহীয়া কঠীয়াতলীৰ পৰা কঠীয়া সংগ্ৰহ কৰক।
- ৰঞ্জিত, বাহাদুৰ আদিৰ দৰে দীঘদিনীয়া জাতৰ কঠীয়া আগষ্ট মাহৰ ১০ তাৰিখ পৰ্যন্ত পথাৰত ৰুৰ পৰা যায়।
- মধ্যমীয়া কৃষিকালৰ জাত যেনে, শ্রাবণী, সত্যৰঞ্জন, বসুন্ধৰা, লাচিত, চিলাৰায় আদিৰ ২৫-৩০ দিনীয়া কঠীয়া জুলাই মাহৰ ২৫ তাৰিখৰ ভিতৰত সিঁচি আগষ্ট মাহৰ ২০ তাৰিখ পৰ্যন্ত ৰুৰ পৰা যায়।
- বানাক্রগত অঞ্চলৰ বাবে ৰঞ্জিত চাৰ-১, স্বৰ্গ চাৰ-১, জলশ্ৰী, জলকুৰৰী আদি বান সহনশীল জাতৰ ধানৰ কঠীয়া জুলাই মাহৰ ভিতৰত ৰুৰ পাৰি। এই জাতসমূহ পানীত ১০-১২ দিন ডুবি থাকিলেও নষ্ট নহয়।

আগষ্ট মাহত হোৱা বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত :

- অতি কমদিনীয়া জাত যেনে, লুইত, দিচাং আদি ধানৰ ২১-২৫ দিনীয়া কঠীয়া ১০ ছেপেৰুলৈকে ৰুৰ পাৰি। ইয়াৰ বাবে আগষ্ট মাহৰ মাজভাগলৈকে বীজ সিঁচিব পাৰি। এই দুয়োবিধ জাতৰ গজালি ওলোৱা বীজ ছেপেৰুৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈকে মূল পথাৰত ৰোকা মাটিত কঠীয়া সিঁচাৰ দৰে পাতলীয়াকৈ সিঁচিব পাৰি।
- গীতেশ, প্ৰফুল্ল, মনোহৰ শালি, এন্দ্ৰিউ শালি আদিৰ দৰে উন্নত আৰু পলঘাঁকৈ কৰিব পৰা জাতৰ বয়সীয়া কঠীয়া (৪৫-৫৫ দিন) আগষ্ট মাহৰ ৩১ তাৰিখলৈকে পথাৰত ৰুৰ পৰা যায়।
- শেহতীয়া বানপানীয়ে খেতি নষ্ট কৰিলে পানী জমা নোহোৱা মধ্যমীয়া মাটিত তিল, মাটিমাহ, মণ্ডমাহ আদিৰ বীজ সিঁচিব পৰা যায়।

**পলমকৈ হোৱা বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত (ছেপেন্টৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ):**

- থলুৱা জাতৰ বেছি বয়সীয়া কঠীয়া ৰোৱাৰ বাহিৰে অন্য উন্নত বা অধিক উৎপাদনক্ষম জাতৰ ধানৰ খেতি কৰা উচিত নহয়।
- পানী কমাৰ লগে লগে ওখ মাটিত মণ্ড মাহ নাইবা মাটিমাহৰ বীজ ছেপেন্টৰ মাহৰ মাজভাগলৈ সিঁচিব পাৰি।
- পথাৰত পানী পলমকৈ শুকালে বা আঝোৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈকে বানপানী হ'লে ৰবি শস্যৰ বীজ সংগ্ৰহ কৰক। সৰিয়হৰ টি এচ-৩৬, টি এচ-৩৮, টি এচ-৪৬, টি এচ-৬৭ আদি জাত উত্তম। ইয়াৰ উপৰিও মুৰ মাহ, মটৰ মাহ, খোচাৰী মাহ আদিৰ খেতিও কৰিব পাৰি।

**ইষ্টাৎ উত্তৰ হোৱা পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত :**

- বানাক্রান্ত অঞ্চল আৰু বানপানীৰ পৰা মুক্ত হৈ থকা অঞ্চলৰ কৃষকৰ মাজত কঠীয়া আদান-প্ৰদান কৰক।
- জলমগ্ন অঞ্চলত পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব পৰা ৰোগ আৰু কীট-পতংগ বিশেষকৈ শুঁৰপোকৰ আক্ৰমণ নহ'বলৈ পথাৰৰ আলিবোৰ পৰিকল্পনাৰ কৰি বখাৰ লগতে পথাৰত পতংগভোজী চৰাই বহাত সুবিধা হোৱাকৈ বাঁহৰ জেং পুতি দিয়ক। শুঁৰপোকৰ আক্ৰমণ বেছি হ'লে ক্ল'বপাইবিফ'ছ নামৰ দৰবৰ এক চামোচ ও লিটাৰ পানীত মিহলাই স্পে' কৰক।

**সবিশেষ জানিবলৈ আৰু কাৰিকৰী দিহা-পৰামৰ্শৰ বাবে কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়ক /  
কৃষি উন্নয়ন বিষয়া/ মহকুমা কৃষি বিষয়া/ জিলা কৃষি বিষয়া/ স্থানীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানীৰ  
সৈতে যোগাযোগ কৰক।**

**কৃষি বিভাগ, অসম**